

# Rados Sætning

Jonas Lindstrøm Jensen (*jonas@imf.au.dk*)

IMF, 2007

## Indhold

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Schurs Sætning</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Rados Sætning for én lineær ligning</b>	<b>3</b>
3.1	Regulære ligningssystemer . . . . .	3
3.2	Super Modulo $p$ farvningen . . . . .	3
3.3	Bevis for Rados Sætning for én lineær ligning . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Rados Sætning for et lineært ligningssystem</b>	<b>6</b>
4.1	Søjlebetingelsen . . . . .	6
4.2	Regulære lineære ligningssystemer opfylder søjlebetingelsen . . . . .	7
4.3	Homogene og regulære mængdefamilier . . . . .	9
4.4	$N_{m,p,c}$ -mængder . . . . .	10
4.5	Afslutning af beviset for Rados Sætning . . . . .	11

## 1 Indledning

Vi vil antage at, Ramseys Sætning og van der Waerdens Sætning er kendt stof. Beviserne følger argumentationen fra kapitel 3 i Ramsey Theory af Graham, Rothchild og Spencer.

## 2 Schurs Sætning

**Sætning 2.1** (Schur). *Hvis  $\mathbb{N}$  er endeligt farvet, så findes  $x, y, z \in \mathbb{N}$  i samme farve således at*

$$x + y = z$$

*Bevis.* Antag at der er brugt  $r$  farver. Vi har altså en farvning  $\chi : \mathbb{N} \rightarrow [r]$ . Lad  $n$  være givet så

$$n + 1 = R(3; r). \tag{2.1}$$

Definér nu en  $r$ -farvning af kanterne i  $K_{n+1}$  ved

$$\chi^*(i, j) = \chi(|i - j|),$$

hvor vi har nummereret  $K_{n+1}$ 's hjørner ved  $0, 1, 2, \dots, n$ , og hvor  $(i, j)$  angiver kanten givet ved hjørnerne  $i$  og  $j$ . Af (2.1) får vi at der findes en monokromatisk trekant i  $K_{n+1}$ . Dvs der findes  $i > j > k$  så

$$\chi^*(i, j) = \chi^*(j, k) = \chi^*(k, i).$$

Sæt nu

$$\begin{aligned} x &= i - j \\ y &= j - k \\ z &= i - k. \end{aligned}$$

Så er  $x + y = z$ , og per definition af  $\chi^*$  fås at  $\chi(x) = \chi(y) = \chi(z)$ , som ønsket.  $\square$

Vi er nu ude på, at generalisere Schurs sætning. Beviset er ikke så nemt at generalisere, så vi skal have fat i nogle lidt andre metoder. Følgende sætning generaliserer både van der Waerdens Sætning og Schurs Sætning.

**Sætning 2.2.** *For alle  $k, r, s \geq 1$  findes et  $n = n(k, r, s)$  således at hvis  $[n]$  er  $r$ -farvet, så findes  $a, d \geq 1$  så*

$$\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + kd\} \cup \{sd\} \quad (2.2)$$

er monokromatisk.

*Bemærkning 2.3.* For  $s = k = 1$  har vi Schurs Sætning.

*Bevis.* Vi viser sætningen ved induktion over  $r$ .

**$r = 1$**  Sæt  $n = \max(k + 1, s)$  og  $a = d = 1$ . Da der kun er en farve, er det ikke svært at finde noget som helst monokromatisk. Vi skal blot sikre os, at  $n$  er stor nok, til at (2.2) er indeholdt i  $[n]$ .

**$r - 1 \Rightarrow r$**  Lad os definere  $W(t, r)$  som det mindste  $W$ , sådan at hvis  $[W]$  er  $r$ -farvet, så findes en monokromatisk aritmetisk progression af længde  $t$ . Af van der Waerdens Sætning får vi, at en sådan funktion er veldefineret.

Sæt så

$$n = sW(kn(k, r - 1, s), r).$$

Lad  $\chi$  være en  $r$ -farvning på  $[n]$ . Af van der Waerdens Sætning kan vi nu finde  $a', d'$  så

$$\{a' + id' \mid 0 \leq i \leq k \cdot n(k, r - 1, s)\}$$

er monokromatisk og indeholdt i  $[W(kn(k, r - 1, s), r)]$ . Lad os for nemheds skyld sige, at den er rød. Hvis der nu findes et  $j$ ,  $1 \leq j \leq n(k, r - 1, s)$ , sådan at  $sd'j$  er rød, er vi færdige, for så kan vi sætte  $a = a'$  og  $d = jd'$ , og vi har dermed at (2.2) er rød.

Hvis nu der ikke findes et sådant  $j$ , så er ingen af elementerne i  $\{sd'j \mid 1 \leq j \leq n(k, r - 1, s)\}$  røde, og dermed er mængden  $(r - 1)$ -farvet.  $(r - 1)$ -farvningen af  $\{sd'j \mid 1 \leq j \leq n(k, r - 1, s)\}$  svarer til en  $(r - 1)$ -farvning af  $[n(k, r - 1, s)]$  - sæt  $\chi^*(i) = \chi(sd'i)$  (det er blot en skalering med faktor  $sd'$ ). Pr induktion ved vi så, at der findes  $\hat{a}, \hat{d}$ , så

$$\{\hat{a}, \hat{a} + \hat{d}, \hat{a} + 2\hat{d}, \dots, \hat{a} + k\hat{d}\} \cup \{s\hat{d}\}$$

er  $\chi^*$ -monokromatisk på  $[n(k, r - 1, s)]$ . Så hvis vi oversætter tilbage til vores oprindelige farvning  $\chi$  ved at sætte  $a = sd'\hat{a}$  og  $d = sd'\hat{d}$  får vi en  $\chi$ -monokromatisk (2.2).  $\square$

Dette kan udvides til følgende resultat, som vi skal bruge senere.

**Korollar 2.4.** For alle  $k, r, s \geq 1$  findes  $n = n(k, r, s)$  således, at hvis  $[n]$  er  $r$ -farvet, findes  $a, d > 0$  så

$$\{a + \lambda d \mid -k \leq \lambda \leq k\} \cup \{sd\}.$$

### 3 Rados Sætning for én lineær ligning

#### 3.1 Regulære ligningssystemer

**Definition 3.1** (Regulære ligningssystemer). Et ligningssystem  $S$  på variable  $x_1, x_2, \dots, x_n$  på en mængde  $A$  kaldes  $r$ -regulær på  $A$ , hvis der for alle  $r$ -farvninger af  $A$  findes en monokromatisk løsning til  $S$ . Hvis det gælder for alle  $r$  kaldes  $S$  regulær på  $A$ .

**Eksempel 3.2.** Schurs Sætning siger, at  $x_1 + x_2 - x_3 = 0$  er regulær på  $\mathbb{N}$ . Sætning 2.2 på forrige side siger at for alle  $k$  er

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + d \\ x_2 &= x_1 + d \\ &\vdots \\ x_k &= x_{k-1} + d \end{aligned}$$

på variablene  $\{x_0, x_1, \dots, x_k, d\}$  regulær på  $\mathbb{N}$ .

Vi vil nu forsøge at generalisere de resultater yderligere.

#### 3.2 Super Modulo $p$ farvningen

Vi får brug for følgende resultat

**Lemma 3.3.** Lad  $q \in \mathbb{Q}$ ,  $q \neq 0$ , og lad  $p$  være et primtal. Så kan  $q$  skrives entydigt på formen

$$q = \frac{p^j a}{b},$$

hvor  $(a, b) = 1$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \geq 0$  og  $p$  ikke går op i hverken  $a$  eller  $b$ .

*Bemærkning 3.4.* Det  $j$  vi får i opskrivningen, kaldes *ranken* for  $q$ , og betegnes  $\text{rank}(q)$ .

*Bevis.* Enhver brøk kan klart skrives på den form. Tilbage er entydigheden. Lad os antage at  $q$  er skrevet på to forskellige måder

$$\frac{p^j a}{b} = \frac{p^i c}{d}.$$

Så er  $p^j ad = p^i cb$ . Antag nu, at  $i \neq j$ . WLOG kan vi antage, at  $i < j$ . Så er

$$p^{j-i} ad = cb.$$

Da  $p$  ikke går op i hverken  $c$  eller  $b$  går  $p$  ikke op i HS. Det er en modstrid, da  $p$  går op i  $VS$ . Altså må  $i = j$ . Så er  $ad = cb$ . Dvs at

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}.$$

Men da  $(a, b) = (c, d) = 1$  er begge brøker uforkortelige og dermed ens. Sidste mulighed for problemer er, hvis  $a = -c$  og  $b = -d$ , men den mulighed har vi udelukket, ved at kræve at nævnerne skal være positive.  $\square$

Dette giver os mulighed for at definere følgende farvning, der bliver vigtig i de følgende beviser.

**Definition 3.5** (smod  $p$  farvningen). For et primtal  $p$  definerer vi *Super Modulo  $p$  Farvningen* på  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$  ved

$$F_p(q) = \frac{a}{b} \pmod{p},$$

hvor  $a, b$  er som i Lemma 3.3 på foregående side. Division med  $b$  er veldefineret modulo  $p$ , da  $p$  ikke går op i  $b$ , der derfor har en multiplikativ invers modulo  $p$ .

**Proposition 3.6.** *Smod  $p$  farvningen er multiplikativ, dvs*

$$F_p(xy) \equiv F_p(x)F_p(y) \pmod{p}.$$

*Specielt gælder*

$$F_p(x) = F_p(y) \Rightarrow F_p(\alpha x) = F_p(\alpha y)$$

for alle  $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ .

*Bevis.* Det er nok at vise, at  $F_p$  er multiplikativ. Lad  $x$  og  $y$  være skrevet som i Lemma 3.3 på forrige side. Dvs

$$x = \frac{p^j a}{b}, \quad y = \frac{p^i c}{d}.$$

Så er

$$xy = \frac{p^{j+i} ac}{bd}.$$

Lad nu  $g = \gcd(ac, bd)$ ,  $m = ac/g$  og  $n = bd/g$ . Så har vi

$$xy = \frac{p^{j+i} m}{n}.$$

Den opskrivning opfylder alle krav Lemma 3.3 på foregående side, dvs. det er den entydige opskrivning af  $xy$ . Altså er

$$F_p(xy) = \frac{m}{n} \pmod{p}.$$

På den anden side har vi

$$F_p(x)F_p(y) \equiv \frac{a}{b} \frac{c}{d} \pmod{p},$$

Så da  $\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{m}{n}$ , har vi den ønskede identitet.  $\square$

### 3.3 Bevis for Rados Sætning for én lineær ligning

**Sætning 3.7** (Rados Sætning for én lineær ligning). *Lad  $S$  være givet ved*

$$c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n = 0, \quad c_i \in \mathbb{Z}. \quad (3.1)$$

*Så gælder, at  $S$  er regulær på  $\mathbb{N}$  hvis og kun hvis en ikke tom delmængde af  $c_i$ 'erne summer til nul.*

*Bevis.* Lad os først antage, at der findes en ikke tom delmængde af  $c_i$ 'erne der summer til nul. Lad en farvning være givet. Vi vil nu finde en monokromatisk løsning til (3.1). Ved passende nummerering har vi

$$c_1 + \cdots + c_k = 0.$$

Lad os antage, at ingen af  $c_i$ 'erne er nul for  $i \leq k$ . Hvis  $k = n$  kan vi sætte  $x_1 = \cdots = x_n = 1$ , hvilket løser (3.1). Vi kan derfor nu antage, at  $k < n$ . Vi definerer

$$\begin{aligned} A &= \gcd(c_1, \dots, c_k), \\ B &= c_{k+1} + \cdots + c_n, \\ s &= \frac{A}{\gcd(A, B)}. \end{aligned}$$

Hvis  $A = 0$  eller  $B = 0$  ville  $s$  ikke være veldefineret. Men da ingen af  $c_i$ 'erne er nul for  $i \leq k$  må  $A > 0$ . Hvis  $B = 0$  måtte  $c_1 + \cdots + c_n = 0$ , og dermed er  $x_1 = \cdots = x_n = 1$  en løsning til (3.1). Det er desuden klart, at  $s$  er et helt tal. Sæt nu

$$t = \frac{Bs}{A}.$$

Så er  $t$  et helt tal, og vi har ligheden

$$At + Bs = 0. \tag{3.2}$$

Lad  $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{Z}$  være givet så  $\mu_1 c_1 + \cdots + \mu_k c_k = A$ . Sæt  $\lambda_i = t\mu_i$  for  $i = 1, \dots, k$ . Vi har altså

$$\lambda_1 c_1 + \cdots + \lambda_k c_k = At. \tag{3.3}$$

Definér  $\lambda = \max_i |\lambda_i|$ . Af Korollar 2.4 på side 3 får vi, at der findes  $a, d > 0$  så  $\{a + jd \mid |j| \leq \lambda\} \cup \{sd\}$  er monokromatisk. Hvis vi så definerer

$$x_i = \begin{cases} a + \lambda_i d & \text{for } i \leq k \\ sd & \text{for } i > k \end{cases}$$

løser  $x_i$ 'erne (3.1). Det ses ved direkte udregning:

$$c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n = a(c_1 + \cdots + c_k) + d(c_1 \lambda_1 + \cdots + c_k \lambda_k) + sd(c_{k+1} + \cdots + c_n) = d(At + Bs) = 0$$

som ønsket.

Lad os vise den anden implikation ved modstrid. Antag at *ingen* ikke tomme delmængder af  $c_i$ 'erne summer til nul. Vi vil nu finde en farvning af  $\mathbb{N}$  således at (3.1) *ikke* har nogen monokromatiske løsninger. Dette fås af følgende påstand.

*Påstand.* Hvis  $p$  er et primtal, der *ikke* går op i nogen ikke-tomme delsummer af  $c_i$ 'erne, så har (3.1) ikke nogen monokromatiske løsninger mht super modulo  $p$  farvningen.

Da der kun er endeligt mange  $c_i$ 'er, og ingen af deres delsummer er nul, kan vi sagtens finde et primtal der ikke går op i nogen af delsummerne – man kan fx bare vælge et, der er meget stort. Det  $p$  giver os en farvning, nemlig smod  $p$  farvningen, så (3.1) ikke har nogen monokromatiske løsninger. Altså giver påstanden det ønskede.

For at gøre forvirringen komplet, vil vi vise påstanden ved modstrid. Så lad os antage, at vi for et primtal  $p$  har en monokromatisk løsning mht. smod  $p$  farvningen. Hvis vi nu kan vise, at  $p$  går op i en ikke tom delsum af  $c_i$ 'erne er vi færdige.

Lad  $x_1, \dots, x_n$  være en monokromatisk løsning til (3.1). Lad nu  $d$  være givet så  $x_i d \in \mathbb{Z}$  for alle  $i$ . Sæt nu

$$\mu = \frac{d}{\gcd_i(x_i d)},$$

så af Lemma 3.6 på side 4 får vi, at  $\mu x_1, \dots, \mu x_n$  også er monokromatisk. Det er også klart en løsning til (3.1), og tilmed er den heltallig og opfylder  $\gcd_i(\mu x_i) = 1$ . Lad os for nemheds skyld kalde denne løsning for  $x_i$ .

Lad os nu nummerere  $x_i$ 'erne efter hvorvidt  $p$  går op i dem eller ej. Sæt de  $x_i$ 'er  $p$  ikke går op i på de første  $k$  pladser, og sæt resten på de sidste  $n - k$  pladser. Da  $\gcd_i(x_i) = 1$  kan  $p$  ikke dele dem allesammen, så  $k \geq 1$ .

Da  $x_i$ 'erne løser (3.1) løser de specielt ligningen, hvis vi betragter den modulo  $p$ ,

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

De sidste  $n - k$  af  $x_i$ 'erne er delelige med  $p$ , så når vi regner modulo  $p$  er de nul, dvs at

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i \equiv 0 \pmod{p}.$$

Da  $p$  ikke går op  $x_i$  for  $i \leq k$ , og da  $x_i$ 'erne har samme farve mht. smod  $p$  farvningen, må  $x_i \equiv x_j \pmod{p}$  for  $i, j \leq k$ , per definition af smod  $p$  farvningen. Dvs at

$$x_1 \equiv x_2 \equiv \dots \equiv x_k \pmod{p}.$$

Kald den fælles værdi for  $y$ . Vi har altså at

$$0 \equiv \sum_{i=1}^k c_i x_i \equiv \left( \sum_{i=1}^k c_i \right) y \pmod{p}.$$

Dvs at  $p$  går op i  $\left( \sum_{i=1}^k c_i \right) y$ . Da  $y$  netop var defineret som den fælles værdi modulo  $p$  af de første  $k$   $x_i$ 'er, der jo netop ikke kunne deles med  $p$ , går  $p$  ikke op i  $y$ . Da  $p$  er et primtal, må det derfor gælde, at  $p$  går op i  $\sum_{i=1}^k c_i$ , og vi har derfor vores ønskede modstrid.  $\square$

## 4 Rados Sætning for et lineært ligningssystem

Vi vil nu generalisere Rados Sætning til at gælde for lineære ligningssystemer med flere ligninger. Alle linearkombinationer i det følgende er over  $\mathbb{Q}$ .

### 4.1 Søjlebetingelsen

**Definition 4.1** (Søjlebetingelsen). Lad  $C$  være en matrix med søjler  $c_1, \dots, c_n$ .  $C$  siges at opfylde *søjlebetingelsen* hvis søjlerne kan nummereres således at vi kan finde  $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_n = n$ , sådan at hvis vi sætter

$$A_i = \sum_{j=k_{i-1}+1}^{k_i} c_j$$

er følgende opfyldt

- $A_1 = 0$ .
- $A_i$  kan skrives som en linearkombination af  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_{i-1}$  for  $i > 1$ .

## 4.2 Regulære lineære ligningssystemer opfylder søjlebetingelsen

**Sætning 4.2** (Rados Sætning for lineære ligningssystemer). *Lad  $C$  være en heltallig matrix. Ligningssystemet  $Cx = 0$  er regulært på  $\mathbb{N} \iff C$  opfylder søjlebetingelsen.*

Lad os først vise  $\Rightarrow$ . Vi får brug for følgende definition.

**Definition 4.3.** Lad  $C$  være en matrix. Lad  $\{\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k\}$  være en delmængde af  $C$ 's søjler således at  $\underline{c}_1 + \dots + \underline{c}_k \neq 0$ . Definér nu

$$E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k) = \{p \mid \underline{c}_1 + \dots + \underline{c}_k \equiv 0 \pmod{p}\}.$$

Hvis nu  $A$  er en sum af nogle andre af  $C$ 's søjlevektorer (ikke nogen fra  $\{\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k\}$ ) således at  $A$  ikke er en linearkombination af  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k$  sætter vi

$$E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k; A) = \{p \mid Ap^m \text{ er en linearkombination af } \underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k \text{ modulo } p^{m+1} \text{ for et } m \geq 0\}.$$

Vi sætter nu  $E$  til at være foreningen af alle sådanne  $E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k)$ 'ere og  $E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k; A)$ 'ere.

**Lemma 4.4.**  *$E$  er en endelig mængde.*

*Bevis.* Hvis vi kan vise, at  $E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k)$  og  $E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k; A)$  er en endelige mængder for alle forskellige  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_n$  og  $A$  er vi færdige, for  $E$  er en endelig forening af disse, og vil derfor selv være endelig.

$E(\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k)$  er klart en endelig mængde, idet tilpas store  $p$  ikke kan gå op i  $\underline{c}_1 + \dots + \underline{c}_k$ . Så lad  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k$  være givet, og lad  $A$  være en sum af nogen af de resterende søjler. Da  $A$  ikke er en linearkombination af  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k$  findes en vektor  $\underline{u}$  der er ortogonal på alle  $\underline{c}_i$ 'erne, men ikke på  $A$ , dvs.  $\underline{u} \cdot \underline{c}_i = 0$  for alle  $i$ , men  $\underline{u} \cdot A \neq 0$ .  $\underline{u}$  er rationel, men vi kan skalere den med en passende konstant så både  $\underline{u}$  og  $\underline{u} \cdot A$  er heltallig. Antag nu, at  $Ap^m$  er en linearkombination af  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_k$  for et  $m$  modulo  $p^{m+1}$ , dvs.

$$Ap^m \equiv \underline{c}_1 x_1 + \dots + \underline{c}_k x_k \pmod{p^{m+1}},$$

hvor vi regner modulo  $p^{m+1}$  koordinatvis. Hvis vi nu tager prikprodukt med  $\underline{u}$  på begge sider får vi  $(\underline{u} \cdot A)p^m$  på VS og

$$\underline{u} \cdot (\underline{c}_1 x_1 + \dots + \underline{c}_k x_k) = (\underline{u} \cdot \underline{c}_1)x_1 + \dots + (\underline{u} \cdot \underline{c}_k)x_k = 0$$

på HS. Så alt i alt har vi at

$$(\underline{u} \cdot A)p^m \equiv 0 \pmod{p^{m+1}},$$

altså at  $p \mid (\underline{u} \cdot A)$ . Men det kan højst lade sig gøre for endeligt mange primtal  $p$ , som ønsket.  $\square$

Vi er nu klar til at vise  $\Rightarrow$  i Sætning 4.2. Antag at vi har et ligningssystem  $Cx = 0$ , der er regulært. Lad  $p$  være et primtal. Da  $E$  er en endelig mængde, kan vi vælge  $p$  således at  $p \notin E$ . Da  $Cx = 0$  er regulær, findes specielt en monokromatisk løsning  $x_1, \dots, x_n$  mht. smod  $p$  farvningen.

Vi kan ordne  $x_i$ 'erne efter rang. Søjlerne i  $C$  skal selvfølgelig permuteres tilsvarende. Se bemærkningen til Lemma 3.3 på side 3 for definitionen af rank. Vi finder  $k_i, m_i, i = 1, 2, \dots, t$  så

$$\text{rank}(x_i) = \begin{cases} m_1 & \text{for } 1 \leq i \leq k_1 \\ m_2 & \text{for } k_1 < i \leq k_2 \\ \vdots & \vdots \\ m_t & \text{for } k_{t-1} < i \leq k_t \end{cases}$$

og  $m_1 < m_2 < \dots < m_t$ . Lad  $a$  betegne den fælles farve mht. smod  $p$  farvningen. Så hvis vi skriver  $x_i$  som et polynomium af  $p$  er  $a$  koefficienten til det led, der har den mindste grad, altså er

$$x_i = ap^{\text{rank}(x_i)} + \text{led at højere grad.}$$

Vi erstatter nu alle  $x_i$ 'er med  $x_i p^{-m_1}$ . Vi har stadig en monokromatisk løsning, men nu er den mindste rang  $m_1$  lig med nul.

De  $x_i$ 'er, der ikke har rang nul, dvs for  $i > k_1$ , er delelige med  $p$ . Så da

$$c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0,$$

er

$$c_1 x_1 + \dots + c_{k_1} x_{k_1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

For  $i \leq k_1$  er  $x_i \equiv a \pmod{p}$ , så alt i alt har vi

$$(c_1 + \dots + c_{k_1})a \equiv 0 \pmod{p}.$$

Det er klart, at  $p$  ikke deler  $a$ , så  $p$  må dele  $c_1 + \dots + c_{k_1}$ , dvs. at  $c_1 + \dots + c_{k_1} \equiv 0 \pmod{p}$ . Antag nu for modstrid, at  $c_1 + \dots + c_{k_1} \not\equiv 0$ . Så ville  $p \in E(c_1, \dots, c_{k_1}) \subseteq E$ , men det er modstrid mod antagelsen om, at  $p \notin E$ , så derfor må vi have, at

$$c_1 + \dots + c_{k_1} = 0,$$

hvilket præcis er første betingelse i søjlebetingelsen. Lad nu

$$A_j = \sum_{i=k_{j-1}+1}^{k_j} c_i,$$

for  $j > 1$ . Vi har, at  $Cx = 0$ , så specielt er

$$\sum_{i=1}^{k_{j-1}} c_i x_i + A_j p^{m_j} a \equiv 0 \pmod{p^{m_j+1}}.$$

Da  $p$  ikke deler  $a$  har  $a$  en invers modulo  $p^{m_j+1}$ , lad os kalde den  $b$ . Ved at gange med  $b$  på begge sider og flytte lidt rundt får vi nu

$$A_j p^{m_j} \equiv \sum_{i=1}^{k_{j-1}} (-b) c_i x_i \pmod{p^{m_j+1}}.$$

Så  $A_j p^{m_j}$  er altså skrevet som en linearkombination af  $c_1, \dots, c_{k_{j-1}} \pmod{p^{m_j+1}}$ . Antag nu, at  $A_j$  ikke er en linearkombination af  $c_1, \dots, c_{k_{j-1}}$ . Så ville  $p \in E(c_1, \dots, c_{k_{j-1}}; A_j) \subseteq E$ , men det har vi jo netop antaget at  $p$  ikke er. Dvs at  $A_j$  er en linearkombination af  $c_1, \dots, c_{k_{j-1}}$ . Dette gælder for alle  $1 < j \leq t$ , hvilket præcis er anden betingelse i søjlebetingelsen. Søjlebetingelsen er altså opfyldt, hvilket viser  $\Rightarrow$  i Rados Sætning.

### 4.3 Homogene og regulære mængdefamilier

Vi får brug for følgende definition, for at kunne vise den anden implikation.

**Definition 4.5.** Lad  $\mathcal{A}$  være en familie af endelige delmængder af  $\mathbb{N}$ .  $\mathcal{A}$  kaldes *homogen*, hvis

$$A \in \mathcal{A}, a \in \mathbb{N} \Rightarrow aA \in \mathcal{A}.$$

**Definition 4.6.**  $\mathcal{A}$  kaldes *regulær*, hvis der for alle endelige farvninger af  $\mathbb{N}$  findes en monokromatisk  $A \in \mathcal{A}$ .

**Sætning 4.7.** Lad  $\mathcal{A}$  være homogen og regulær, og lad  $M > 0$ . Hvis  $\mathbb{N}$  er endeligt farvet, findes  $A \in \mathcal{A}, d > 0$  så

$$a + \lambda d, \quad a \in A, |\lambda| \leq M,$$

alle har samme farve.

*Bevis.* Lad  $r$  være antallet af farver. Af kompakthedsprincippet ved vi, at der findes et  $R$  således at enhver  $r$ -farvning af  $[R]$  giver en monokromatisk  $A \in \mathcal{A}$  så  $A \subseteq [R]$ .

Lad  $\chi$  være en  $r$ -farvning. Vi definerer nu en  $r^R$ -farvning  $\chi^*$  ved

$$\chi^*(\alpha) = \chi^*(\beta) \iff \chi(\alpha i) = \chi(\beta i) \quad \forall 1 \leq i \leq R.$$

Vi har brug for netop  $r^R$  farver. Det kan ses ved at betragte  $\chi^*(\alpha)$  som en  $R$ -dimensional vektor, hvor den  $i$ 'te indgang er  $\alpha i$ . Hver af indgangene kan have  $r$  forskellige farver, og der er  $R$  af dem.

Sæt nu  $T = MR^{R-1}$  (big one...). Af van der Waerdens sætning ved vi, at vi kan finde en aritmetisk progression af længde  $2T + 1$ , der er monokromatisk under  $\chi^*$ . Dvs der findes  $b, e$  således at

$$\chi^*(c + \mu e), \quad |\mu| \leq T$$

alle har samme farve. Hvis vi nu betragter  $c[R]$  som værende farvet med  $\chi$ , får vi, at der findes en  $A' \in \mathcal{A}$  således at  $cA'$  er  $\chi$ -monokromatisk. Det gælder, da en  $r$ -farvning af  $c[R]$  blot svarer til en  $r$ -farvning af  $[R]$ , og der ved vi, at der altid findes en monokromatisk  $A' \in \mathcal{A}$ . Lad nu  $A = cA'$ . Per homogenitet af  $\mathcal{A}$  har vi, at  $A \in \mathcal{A}$ .

Lad nu  $a \in A$  være givet. Så findes et  $a' \in A'$  så  $a = a'c$ . Lad nu

$$m = \text{lcm } A', \quad d = em.$$

For  $|\lambda| \leq M$  har vi nu

$$a + \lambda d = a'c + e\lambda m = a' \left( c + e\lambda \frac{m}{a'} \right).$$

Vi har at  $A' \subseteq [R]$ , så  $\left| \frac{m}{a'} \right| \leq R^{R-1}$ . Altså har vi, at

$$\left| \lambda \frac{m}{a'} \right| \leq MR^{R-1} = T,$$

så  $c + e\lambda \frac{m}{a'}$  er altså i vores  $\chi^*$ -monokromatiske aritmetiske progression. Så

$$\chi^* \left( c + e\lambda \frac{m}{a'} \right) = \chi^*(c).$$

Per definition af  $\chi^*$  betyder det specielt, da  $a' \leq R$ , at

$$\chi\left(a' \left(c + e\lambda \frac{m}{a'}\right)\right) = \chi(a'c).$$

Altså at

$$\chi(a + \lambda d) = \chi(a).$$

Dette gælder for alle  $a \in A, |\lambda| \leq M$ . Vi ved, at  $A$  er  $\chi$ -monokromatisk, dvs. at  $\chi(a)$  er den samme for alle  $a$ . Så vi får altså, at  $\chi(a + \lambda d)$  har samme farve for alle  $a \in A, |\lambda| \leq M$ , som ønsket.  $\square$

**Korollar 4.8.** *Lad  $\mathcal{A}$  være homogen og regulær, og lad  $M, c > 0$ . Hvis  $\mathbb{N}$  er endeligt farvet, findes  $A \in \mathcal{A}, d > 0$  så*

$$a + \lambda d, \quad a \in A, |\lambda| \leq M$$

og

$$cd$$

alle har samme farve.

*Bevis.* Dette vises ved induktion over antallet af farver, nøjagtigt ligesom vi viste Sætning 2.2 på side 2 ud fra van der Waerdens sætning.  $\square$

#### 4.4 $N_{m,p,c}$ -mængder

Til at afslute beviset, får vi brug for følgende lidt mystiske definition

**Definition 4.9.** Lad  $m, p, c > 0$  være hele tal. Vi definerer

$$N_{m,p,c} = \{(\lambda_1, \dots, \lambda_{m+1}) \mid \text{nogen } \lambda_i \neq 0, \text{ den første ikke-nul } \lambda_i = c, \text{ alle andre } |\lambda_i| \leq p\}.$$

En mængde  $S \subseteq \mathbb{N}$  kaldes en  $(m, p, c)$ -mængde, hvis der findes  $y_1, \dots, y_{m+1} \in \mathbb{Q}$  så

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i y_i \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_{m+1}) \in N_{m,p,c} \right\}.$$

**Sætning 4.10.** *Lad  $m, p, c > 0$ . Hvis  $\mathbb{N}$  er endeligt farvet, findes en monokromatisk  $(m, p, c)$ -mængde  $S$ .*

*Bevis.* Vi vil vise dette ved induktion over  $m$ .

**$m = 1$**  Vi har

$$N_{1,p,c} = \{(0, c)\} \cup \{(c, \lambda) \mid |\lambda| \leq p\}.$$

Vi vil bruge Korollar 2.4 på side 3. Sæt i korollaret  $k = p, s = c$ . Så får, vi at der findes et  $a$  så

$$\{a + \lambda d \mid |\lambda| \leq p\} \cup \{cd\}$$

er monokromatisk. Sæt  $y_1 = \frac{a}{c}, y_2 = d$ , så er  $(1, p, c)$ -mængden

$$S = \{cd\} \cup \{a + \lambda d \mid |\lambda| \leq p\},$$

hvilket vi jo netop viste, var monokromatisk.

$m \Rightarrow m + 1$  En  $(m + 1, p, c)$ -mængde er en  $(m, p, c)$ -mængde, hvor der til alle elementer er lagt et ekstra  $\lambda_{m+2}y_{m+2}$  til, hvor  $|\lambda_{m+2}| \leq p$ , og hvor der er tilføjet det tilfælde, hvor  $\lambda_{m+2} = c$  og  $\lambda_i = 0$  for  $i \leq m + 1$ .

Induktionsantagelsen betyder specielt, at mængden af  $(m, p, c)$ -mængder er regulær. Den er også klart homogen. Altså kan vi bruge Korollar 4.8 på forrige side. Hvis vi bruger korollaret med  $M = p$  og vælger  $y_{m+2} = d$  hvor  $d$ 'et kommer fra korollaret, så får vi netop, at vi kan lægge det ønskede ekstra led til alt i vores  $(m, p, c)$ -mængde, og hver gang få noget i samme farve.

Korollaret giver også, at  $cd = cy_{m+2}$  har samme farve som resten, hvilket præcis er det vil skal bruge, for at klare det tilfælde hvor  $\lambda_{m+2} = c$  og  $\lambda_i = 0$  for  $i \leq m + 1$ . Så per induktion er sætningen bevist.  $\square$

Vi er nu klar til at vise, at hvis en matrix  $C$  opfylder søjlebetingelsen, så er  $Cx = 0$  regulær. Vi vil finde en løsning på formen

$$x_i = \lambda_{i1}y_1 + \cdots + \lambda_{it}y_t,$$

hvor  $\lambda_{ij} \in \mathbb{Z}$  og  $y_i$ 'erne kan vælges frit. Hvis vi så kan vise, at vi kan finde  $m, p, c > 0$  så

$$(\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{it}) \in N_{m,p,c}$$

for alle  $i$ , må alle  $x_i$  ligge i den samme  $(m, p, c)$ -mængde, som vi ifølge sætningen ovenfor kan vælge monokromatisk.

## 4.5 Afslutning af beviset for Rados Sætning

Antag at  $C$  opfylder søjlebetingelsen. For  $j > 1$  kan  $A_j$  skrives som en linearkombination af  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_{k_j-1}$ . Sæt nu

$$\begin{aligned} z_1 &= \underline{c}_1 + \cdots + \underline{c}_{k_1} \\ z_2 &= -A_2 + \underline{c}_{k_1+1} + \cdots + \underline{c}_{k_2} \\ &\vdots \\ z_t &= -A_t + \underline{c}_{k_{t-1}+1} + \cdots + \underline{c}_n \end{aligned}$$

Så er  $z_j = 0$  for alle  $j$ , og de er alle skrevet som en linearkombination af  $\underline{c}_i$ 'er. Lad os nu skrive  $z_i$ 'erne som vektorer i basen  $\underline{c}_1, \dots, \underline{c}_n$  ( $\underline{c}_i$ 'erne udgør ikke nødvendigvis en basis, men det betyder ikke noget). De får følgende form

$$\begin{aligned} \underline{w}_1 &= 1, \dots, 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \underline{w}_2 &= - & 1, \dots, 1 & 0 & 0 & 0 \\ \underline{w}_3 &= - & - & 1, \dots, 1 & 0 & 0 \\ &\vdots & - & - & - & \ddots & 0 \\ \underline{w}_t &= - & - & - & - & 1, \dots, 1 \end{aligned}$$

De vandrette streger er de indgange der kommer fra  $-A_j$ 'erne. Vi ved blot, at de er rationelle. Alle disse  $\underline{w}_i$ 'ere er løsninger til  $C\underline{x} = 0$ . Hvis vi nu ganger dem allesammen med den samme passende konstant, så alle indgange bliver hele tal, er de stadig løsninger til  $C\underline{x} = 0$ . Kald denne konstant  $c$ .

Lad os nu betegne den  $i$ 'te indgang i  $\underline{w}_j$  med  $w_{ji}$ . Sæt nu

$$\lambda_{ij} = w_{ji}.$$

Hvis vi nu definerer  $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$  ved

$$x_i = \lambda_{i1}y_1 + \dots + \lambda_{it}y_t,$$

er  $\underline{x}$  en linearkombination af  $w_j$ 'erne, og dermed er  $\underline{x}$  en løsning til  $C\underline{x} = 0$ . Vi mangler nu blot at vise, at vi kan finde  $m, p, c > 0$  så

$$(\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{it}) \in N_{m,p,c}$$

for alle  $i$ . Vi har defineret  $c$ . Den første ikke-nul indgang i  $(\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{it})$  er netop  $c$ , som ønsket. For at dimensionen skal passe, må  $m = t - 1$ . Hvis vi så sætter  $p = \max |\lambda_{ij}|$  har vi det ønskede, og vi har dermed vist Rados Sætning.